

予防接種名	ワクチンの種類	標準的な接種機関	接種方法	他の予防接種との間隔
ロタウイルス	生（経口）	1価（ロタリックス）：生後2か月～生後24週0日後まで 5価（ロタテック）：生後2か月～生後32週0日後まで ※1回目の接種は生後14週6日後まで	1価：27日以上2回接種 5価：27日以上3回接種	注射生ワクチンのみ接種後27日以上の間隔をあげる。その他のワクチンについては制限なし。
ヒブ	不活化（注射）	初回：生後2～7か月に至るまで 追加：初回終了後7～13か月	初回：27～56日までの間隔で3回接種 追加：1回目接種	
小児用肺炎球菌	不活化（注射）	初回：生後2～7か月に至るまで（生後12か月までに完了） 追加：生後12～15か月に至るまで	初回：27日以上の間隔で3回接種 追加：初回3回目から60日以上で1回接種	
B型肝炎	不活化（注射）	生後2～9か月に至るまで	27日以上間隔をおいて2回接種、初回接種から139日以上を経過した後に1回接種	
4種混合 ・百日せき ・ジフテリア ・破傷風 ・不活化ポリオ	不活化（注射）	1期初回：生後2～12か月 1期追加：初回終了後 1年～1年6か月までの間隔をおく	初回：20～56日までの間隔で3回接種 追加：初回接種終了後、6か月以上の間隔をおく	
5種混合 ・百日せき ・ジフテリア ・破傷風 ・不活化ポリオ ・Hib感染症	不活化（注射）	1期初回：生後2～7か月 1期追加：初回終了後 6か月～1年6か月までの間隔をおく	初回：20日以上の間隔をおいて3回接種 追加：初回接種終了後、6か月以上の間隔をおく	
BCG	生（注射）	生後5～8か月に達するまで	1回接種	
麻しん 風しん混合 (MR)	生（注射）	第1期：生後12～24か月に至るまで 第2期：小学校就学前の1年間（年長児）	第1期：1回接種 第2期：1回接種	
水痘	生（注射）	初回：生後12～15か月に達するまで 追加：初回接種終了後、6か月～12か月までの間隔をおく	初回：1回接種 追加：1回接種	
日本脳炎	不活化（注射）	1期初回：3歳に達した時から4歳に達するまでの期間 1期追加：4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 （初回終了後おおむね1年後） 2期：9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	初回：6～28日までの間隔で2回接種 追加：1回接種 2期：1回接種	
二種混合	不活化（注射）	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	1回接種	