

定期予防接種 ※「至るまで」「達するまで」とは、「期日の前日まで」の接種となります。

予防接種名	ワクチンの種類	標準的な接種期間	接種方法
小児用肺炎球菌	不活化 (注射)	初回：生後2～7か月に至るまで (生後12か月までに完了) 追加：生後12～15か月に至るまで	初回：27日以上の間隔において3回接種 追加：初回接種終了後から60日以上の間隔において1回接種
B型肝炎	不活化 (注射)	生後2～9か月に至るまで	初回：27日以上の間隔において2回接種 追加：第1回目の接種から139日以上の間隔において1回接種
ロタウイルス	生 (経口)	1価(ロタリックス) 初回接種：生後2か月～出生14週6日後まで 5価(ロタテック) 初回接種：生後2か月～出生14週6日後まで	1価 27日以上の間隔で2回接種 ※出生24週0日後までに完了 5価 27日以上の間隔で3回接種 ※出生32週0日後までに完了
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	不活化 (注射)	第1期初回：生後2～7か月に至るまで 第1期追加：初回接種終了後6か月～18か月までの間隔をおく	初回：20～56日までの間隔において3回接種 追加：1回接種
BCG	生 (注射)	生後5～8か月に達するまで	1回接種
麻しん風しん混合(MR)	生 (注射)	第1期：生後12～24か月に至るまで 第2期：小学校就学前の1年間(年長児)	第1期：1回接種 第2期：1回接種
水痘	生 (注射)	初回：生後12か月～15か月に達するまで 追加：初回接種終了後、6か月～12か月までの間隔をおく	初回：1回接種 追加：1回接種
日本脳炎	不活化 (注射)	第1期初回：3歳～4歳に達するまで 第1期追加：4歳～5歳に達するまで 第2期：9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	初回：6～28日までの間隔で2回接種 追加：初回接種終了後おおむね1年後に1回接種 第2期：1回接種
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化 (注射)	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	1回接種
ヒトパピローマウイルス感染症	不活化 (注射)	2価 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 4価 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 9価 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間	1か月の間隔において2回接種、1回目の接種から6か月の間隔において1回接種 2か月の間隔において2回接種、1回目の接種から6か月の間隔において1回接種 1回目を15歳になるまでに受ける場合 ＜2回接種＞ 6か月の間隔において2回接種 1回目を15歳になってから受ける場合 ＜3回接種＞ 2か月の間隔において2回接種、1回目の接種から6か月の間隔において1回接種

◎注射生ワクチンを接種後、異なる種類の注射生ワクチンを接種する場合には、27日以上の間隔をおく必要があります。 ※注射生ワクチン：BCG、麻しん風しん混合(MR)、水痘

◎他のワクチンについては、異なるワクチンを接種する際の接種間隔の制限(規定)がありません。